

- 75% всех закрытых травм колена приходится на разрывы мениска.
- мужчины в 4 раза чаще женщин получают травмы мениска.
- красная зона мениска ближе к краю, в ней есть сосуды, поэтому умеет срастаться за 3-6 мес.

Ограничения при реабилитации после повреждения мениска:

- осторожно с игровыми видами спорта (футбол)
- ограничить горные лыжи или использовать жёсткий ортез
- не приседать резко и глубоко, не садиться по-турецки или в позу лотоса.

Можно: велосипед, бег на длинные дистанции, плавание кролем, тренировки в спортзале (функциональные и силовые).

Подробнее читать [здесь](#).

Диагностические тесты:

[Тесты на повреждение мениска](#)

Упражнения

1		"Восьмёрка с чашками" 3 / 10
2		"Египетский шаг" 8 / 10
3		"Русский бильярд" 8 / 10
4		"Шея журавля" 4 / 10
5		#2 Scorpion spin (Handglide, вращение в упоре в живот) 2 / 10
6		#2steppushups 3 / 10
7		#side2sidepushups 1 / 10

8		#squattwist + #highknees 3 / 10
9		#threadcrunches (Продевание ноги) / или с хлопком в ладоши под ногой 4 / 10
10		1 Раствяжка подошвенного свода стопы и сгибателей пальцев стопы сидя нога на ногу 1 / 10
11		1. Подготовка к hollowback: растяжка в плечах; стойка на руках; потянуть подколенные сухожилия (складка пополам); мостик 1 / 10
12		1. Ретракция головы сидя/стоя у вертикальной опоры и без (Втягивание головы) 1 / 10 <ul style="list-style-type: none"> • Маккензи: ≥10 с удержания, ≥12 повторений, 1-3 подхода, <30 сек отдых (6-8 раз в день) • 2-3 подхода по 8-10 раз (3-4 раза в день)
13		10-step (Forth & Back) 2 / 10
14		2 steps footwork (2 шага от 7-steps) 1 / 10
15		2 Раствяжка разгибателей пальцев стопы сидя на стуле/полу (дистальные отделы пальцев) 1 / 10

16		2-step 2 / 10
17		2. Разгибание втянутой шеи в положении СИДЯ 1 / 10 6-8 раз в день по 10 движени
18		2. Складка в pike hollow ногами опираясь на стену 2 / 10
19		2steps: Front-step, Back-step, Side-step (+kick = salsa-step), Side Crossover step 1 / 10 2 мин непрерывно
20		3 Растворяя тыльной части стопы и нижней части НОГИ 1 / 10