

Шинсплинт (медиальный большеберцовый стресс-синдром, синдром расколотой голени) — воспалительное заболевание, возникающее на фоне хронических перегрузок нижних конечностей. Чаще всего оно встречается у бегунов, легкоатлетов, танцоров и футболистов, а также у военных новобранцев и любителей фитнеса.

Основные симптомы: боль вдоль внутреннего края голени, отёк, покраснение кожи, болезненность при пальпации, ограничение подвижности.


Причина заболевания — избыточная нагрузка на ноги, которая возникает при резком увеличении километража, интенсивности тренировок или несоблюдении техники бега. Особое значение имеет и поверхность: бег по асфальту или бетону оказывает сильное ударное воздействие на кость, провоцируя воспаление.

Мышцы:

Икроножная

Упражнения

1	"Восьмёрка с чашками"	3 / 10
2	"Египетский шаг"	8 / 10
3	"Русский бильярд"	8 / 10
4	"Шея журавля"	4 / 10
5	#2 Scorpion spin (Handglide, вращение в упоре в живот)	2 / 10
6	 #2steppushups	3 / 10
7	 #side2sidepushups	1 / 10
8	#squattwist + #highknees	3 / 10

9		#threadcrunches (Продевание ноги) / или с хлопком в ладоши под ногой 4 / 10
10		1 Растворка подошвенного свода стопы и сгибателей пальцев стопы сидя нога на ногу 1 / 10
11		1. Подготовка к hollowback: растворка в плечах; стойка на руках; потянуть подколенные сухожилия (складка пополам); мостик 1 / 10
12		1. Ретракция головы сидя/стоя у вертикальной опоры и без (Втягивание головы) 1 / 10 <ul style="list-style-type: none"> • Маккензи: ≥10 с удержания, ≥12 повторений, 1-3 подхода, <30 сек отдых (6-8 раз в день) • 2-3 подхода по 8-10 раз (3-4 раза в день)
13		10-step (Forth & Back) 2 / 10
14		2 steps footwork (2 шага от 7-steps) 1 / 10
15		2 Растворка разгибателей пальцев стопы сидя на стуле/полу (дистальные отделы пальцев) 1 / 10

16		2-step 2 / 10
17		2. Разгибание втянутой шеи в положении СИДЯ 1 / 10 6-8 раз в день по 10 движени
18		2. Складка в pike hollow ногами опираясь на стену 2 / 10
19		2steps: Front-step, Back-step, Side-step (+kick = salsa-step), Side Crossover step 1 / 10 2 мин непрерывно
20		3 Растворяя тыльной части стопы и нижней части НОГИ 1 / 10